



化合物名 2-ヒドラジノベンゾチアゾール
2-Hydrazinobenzothiazole

純 度	発熱開始温度 Ta 231℃
試 料 量 1.10 mg	To 238℃
雰囲気ガス アルゴン	発 熱 量 180 cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	29.8 kcal/mol
昇温速度 10 ℃/min	最大発熱加速度 9.8 cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	




化合物名 イソニコチン酸ヒドラジド
Isonicotinic acid hydrazide

純 度 特級	発熱開始温度 Ta 274℃
試 料 量 0.90 mg	To 302℃
雰囲気ガス アルゴン	発 熱 量 103 cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	14.2 kcal/mol
昇温速度 10 ℃/min	最大発熱加速度 8.0 cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	



化合物名 2-ヒドロキシ-3-ナフトエ酸ヒドラジド
2-Hydroxy-3-naphtioic acid hydrazide

純 度 一級	発熱開始温度 Ta 210℃
試 料 量 1.93 mg	To 210℃
雰囲気ガス アルゴン	発 熱 量 78 cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	15.7 kcal/mol
昇温速度 10 ℃/min	最大発熱加速度 4.5 cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	



化合物名 ニコチノヒドラジド
Nicotinohydrazide

純 度 98%	発熱開始温度 Ta 251℃
試 料 量 1.42 mg	To 277℃
雰囲気ガス アルゴン	発 熱 量 160 cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	21.9 kcal/mol
昇温速度 10 ℃/min	最大発熱加速度 9.1 cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	

