



化合物名 ホルムアミド
Formamide


純度 95%	発熱開始温度 T_a -℃
試料量 1.43 mg	T_o -℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 - cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	- kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 - cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	


 化合物名 イソニコチンアルデヒド
Isonicotinaldehyde

純度 特級99%	発熱開始温度 T_a 245℃
試料量 1.39 mg	T_o 254℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 22 cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	2.4 kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 35.1 cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	


 化合物名 N-ホルミルモルホリン
N-Formylmorpholine

純度 95%以上	発熱開始温度 T_a -℃
試料量 1.23 mg	T_o -℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 - cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	- kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 - cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	


 化合物名 ムコクロロ酸
Mucochloric acid

純度 一級	発熱開始温度 T_a 247℃
試料量 1.32 mg	T_o 263℃
雰囲気ガス 空気	発熱量 217 cal/g
初期圧力 0 kg/cm ²	36.6 kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 22.3 cal/min ² /g
試料容器 密封	

