



化合物名 3-アセチルインドール
3-Acetylindole

純 度 一級	発熱開始温度 Ta -℃
試 料 量 1.95 mg	To -℃
雰囲気ガス アルゴン	発 熱 量 - cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	- kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 - cal/min ² /g
試料容器 ビンホール	




化合物名 2-アミノ-3-クロロ-1,4-ナフトキノン
2-Amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone

純 度	発熱開始温度 Ta 315℃
試 料 量 1.25 mg	To 343℃
雰囲気ガス アルゴン	発 熱 量 99.5 cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	20.7 kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 115 cal/min ² /g
試料容器 ビンホール	



化合物名 2-アミノアントラキノン
2-Aminoanthraquinone

純 度	発熱開始温度 Ta -℃
試 料 量 1.90 mg	To -℃
雰囲気ガス アルゴン	発 熱 量 - cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	- kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 - cal/min ² /g
試料容器 ビンホール	



化合物名 2-アミノ-3-クロロ-1,4-ナフトキノン
2-Amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone

純 度	発熱開始温度 Ta 285℃
試 料 量 1.56 mg	To 302℃
雰囲気ガス 空気	発 熱 量 195 cal/g
初期圧力 0 kg/cm ²	40.6 kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 327 cal/min ² /g
試料容器 密封	

