


化合物名 IDA (イミノ二酢酸)

Iminodiacetic acid


純 度 99%以上	発熱開始温度 T_a —℃
試 料 量 1.45 mg	T_o —℃
雰囲気ガス アルゴン	発 熱 量 — cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	— kcal/mol
昇温速度 10 ℃/min	最大発熱加速度 — cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	



化合物名 マレイン酸

Maleic acid


純 度 99%	発熱開始温度 T_a —℃
試 料 量 1.62 mg	T_o 302℃
雰囲気ガス アルゴン	発 熱 量 205 cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	23.7 kcal/mol
昇温速度 10 ℃/min	最大発熱加速度 16.9 cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	



化合物名 ギ酸イソプロピル

Isopropyl formate

純 度 95.0%	発熱開始温度 T_a —℃
試 料 量 1.01 mg	T_o —℃
雰囲気ガス アルゴン	発 熱 量 — cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	— kcal/mol
昇温速度 10 ℃/min	最大発熱加速度 — cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	



化合物名 マロン酸

Malonic acid

純 度 98%	発熱開始温度 T_a —℃
試 料 量 2.01 mg	T_o —℃
雰囲気ガス アルゴン	発 熱 量 — cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	— kcal/mol
昇温速度 10 ℃/min	最大発熱加速度 — cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	

