



化合物名 2-ベンゾキサゾリノン
2-Benzoxazolinone

純度 90%以上	発熱開始温度 Ta -℃
試料量 1.32 mg	To -℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 - cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	- kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 - cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	




化合物名 4-ベンジルピリジン
4-Benzylpyridine

純度 一級	発熱開始温度 Ta -℃
試料量 1.22 mg	To -℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 - cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	- kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 - cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	



化合物名 4-ベンジルピペリジン
4-Benzylpiperidine

純度 99%	発熱開始温度 Ta -℃
試料量 1.41 mg	To -℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 - cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	- kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 - cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	



化合物名 無水シトラコン酸
Citraconic anhydride

純度 特級	発熱開始温度 Ta -℃
試料量 1.27 mg	To -℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 - cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	- kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 - cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	

