


化合物名 4-メチル-1,3-ジオキソラン-2-オン

4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one


純度 97%	発熱開始温度 T_a —℃
試料量 1.72 mg	T_o —℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 — cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	— kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 — cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	



化合物名 2-メチルピリジン

2-Methylpyridine


純度 98%	発熱開始温度 T_a —℃
試料量 1.11 mg	T_o —℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 — cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	— kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 — cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	



化合物名 N-メチルモルホリン

N-Methylmorpholine

純度 99%	発熱開始温度 T_a —℃
試料量 1.47 mg	T_o —℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 — cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	— kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 — cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	



化合物名 N-メチル-2-ピリドン

N-Methyl-2-pyridone

純度	発熱開始温度 T_a —℃
試料量 1.71 mg	T_o —℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 — cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	— kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 — cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	

