化合物名　ピリジン
Pyridine

純　　度 99%	発熱開始温度Ta　—℃
試 料 量 1.22 mg	To　—℃
雰囲気ガス アルゴン	発　熱　量 — cal/g
初期圧力 34 kg/cm²	— kcal/mol
昇温速度 10 ℃/min	最大発熱加速度 — cal/min²/g
試料容器 ピンホール	



化合物名　キナルジン
Quinaldine

純　　度 95.0%	発熱開始温度Ta　—℃
試 料 量 1.48 mg	To　—℃
雰囲気ガス アルゴン	発　熱　量 — cal/g
初期圧力 34 kg/cm²	— kcal/mol
昇温速度 10 ℃/min	最大発熱加速度 — cal/min²/g
試料容器 ピンホール	



化合物名　PDT(3-(2-ピリジル)-5,6-ジフェニル-1,2,4トリアジン)
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine

純　　度	発熱開始温度Ta　—℃
試 料 量 1.12 mg	To　—℃
雰囲気ガス アルゴン	発　熱　量 — cal/g
初期圧力 34 kg/cm²	— kcal/mol
昇温速度 10 ℃/min	最大発熱加速度 — cal/min²/g
試料容器ピンポール	



化合物名　キノリン
Quinoline

純　　度 特級	発熱開始温度Ta　—℃
試 料 量 1.68 mg	To　—℃
雰囲気ガス アルゴン	発　熱　量 — cal/g
初期圧力 34 kg/cm²	— kcal/mol
昇温速度 10 ℃/min	最大発熱加速度 — cal/min²/g
試料容器 ピンホール