



化合物名 6-アミノ-1,3-ジメチルウラシル
6-Amino-1,3-dimethyluracil

純度	発熱開始温度 T_a -℃
試料量 1.69 mg	T_o -℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 - cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	- kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 - cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	




化合物名 アミノメタンスルホン酸
Aminomethanesulfonic acid

純度 98%以上	発熱開始温度 T_a -℃
試料量 1.45 mg	T_o -℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 - cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	- kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 - cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	



化合物名 2-アミノ-5-メルカプト-1,3,4-チアジアゾール
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole

純度 98%以上	発熱開始温度 T_a 244℃
試料量 1.52 mg	T_o 244℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 146 cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	19.5 kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 ∞ cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	



化合物名 3-アミノ-5-メチルイソキサゾール
3-Amino-5-methylisoxazole

純度 97%以上	発熱開始温度 T_a 188℃
試料量 1.40 mg	T_o 254℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 446 cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	43.7 kcal/mol
昇温速度 10 °C/min	最大発熱加速度 ∞ cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	

